



Se pronuncia *e-VRIZ-di*.

Cómo comenzar con Evrydsi

El primer y único medicamento para tratar a bebés, niños y adultos con atrofia muscular espinal (spinal muscular atrophy, SMA) en el hogar En personas mayores de 2 meses

¿Qué es Evrydsi?

Evrydsi es un medicamento recetado que se usa para tratar la atrofia muscular espinal (SMA) en adultos y niños mayores de 2 meses.

Se desconoce si Evrydsi es seguro y eficaz en niños menores de 2 meses.

Información importante de seguridad

- Antes de tomar Evrydsi, informe a su proveedor de atención médica sobre todos los problemas de salud que tenga; esto incluye:
 - Si tiene problemas hepáticos.
 - Si está embarazada o planea quedar embarazada. Si está embarazada o planea quedar embarazada, consulte la opinión de su proveedor de atención médica antes de tomar este medicamento. Evrydsi puede dañar al bebé en gestación.
 - Si es una mujer que puede quedar embarazada:
 - Antes de comenzar el tratamiento con Evrydsi, su proveedor de atención médica podría hacerle una prueba de embarazo. Como Evrydsi puede dañar a un bebé en gestación, su proveedor de atención médica decidirá si tomar Evrydsi es lo indicado para usted durante ese tiempo.
 - Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que podrían ser los indicados para usted. Use anticonceptivos mientras dure el tratamiento y durante al menos 1 mes después de interrumpir Evrydsi.

Vea la Información importante de seguridad adicional en todo el folleto y en las páginas 16 y 17.

Cómo usar esta guía

¡Le damos la bienvenida!

El propósito de esta guía es ayudarle a comenzar con Evrysdi. Adentro encontrará instrucciones sobre lo siguiente:



Cómo conseguir y guardar Evrysdi



Cómo preparar Evrysdi



Cómo tomar o administrar Evrysdi

Otra información útil en las páginas que siguen incluye:

- Cómo conectarse con apoyo personal a través del equipo de MySMA Support
- Respuestas a preguntas que tal vez tenga sobre cómo tomar Evrysdi

Antes de preparar su primera dosis, asegúrese de conocer bien la Información para el paciente y las Instrucciones de uso que acompañan su medicamento recetado.



Si tiene preguntas acerca de cómo guardar, administrar o tomar Evrysdi antes de la primera dosis, no dude en contactarse con su proveedor de atención médica.

Información importante de seguridad

- Antes de tomar Evrysdi, informe a su proveedor de atención médica sobre todos los problemas de salud que tenga; esto incluye:
 - Si es un varón adulto que planea tener hijos: Evrysdi puede afectar la capacidad de un hombre de tener hijos (fertilidad). Si esto le preocupa, asegúrese de consultar a su proveedor de atención médica.

Vea la Información importante de seguridad adicional en todo el folleto y en las páginas 16 y 17.

Conocer Evryski

Evryski es el primer y único tratamiento oral que se puede tomar en casa para bebés, niños y adultos con SMA

En personas mayores de 2 meses

Evryski:

 <p>Tiene entrega directa a usted</p>	 <p>Se guarda en el refrigerador</p>	 <p>Se administra después de medir la dosis con las jeringas orales proporcionadas</p>	 <p>Se toma una vez al día por boca o a través de una sonda de alimentación</p>
---	--	---	---



Tome Evryski a la misma hora todos los días después de una comida. Programe el horario de administración regular que le resulte más conveniente. Tal vez le sea útil programar un recordatorio en su teléfono o calendario para acordarse de cuándo tomar la dosis y convertirla en parte de su rutina diaria.



Su proveedor de atención médica determinará cuál es la dosis correcta para usted. Las dosis recomendadas se basan en la edad y el peso; la dosis máxima recomendada de Evryski es 5 mg una vez al día; esto equivale a un poco más de una cucharadita. Tome siempre la dosis exactamente como se la recetaron.

Antes de comenzar con Evryski, informe a su proveedor de atención médica si usted o la persona a la que cuida toma otros medicamentos, vitaminas o suplementos dietarios.





Información importante sobre Evrysdi

✓ SÍ:

- ✓ Pregunte al proveedor de atención médica cómo usar la jeringa oral reutilizable y cómo medir la dosis diaria recetada.
- ✓ Use siempre las jeringas orales proporcionadas y comuníquese con Accredo* de inmediato si recibe jeringas orales que no tienen un tamaño idéntico.
- ✓ Tome la dosis de Evrysdi que le recetó el proveedor de atención médica a usted o a la persona que tiene a su cuidado.
- ✓ Tome la dosis a la misma hora todos los días después de una comida.
- ✓ Guarde el medicamento en posición vertical en el frasco color ámbar original y cierre la tapa del frasco por completo después de su uso.
- ✓ Mantenga Evrysdi refrigerado (36 °F a 46 °F).
- ✓ Verifique la fecha de vencimiento para no usar un medicamento vencido (Evrysdi vence 64 días después de que el farmacéutico lo prepara).
- ✓ Consulte a Accredo cuál es la fecha de "Desechar después del" si esta no está escrita en la etiqueta del frasco.

✗ NO:

- ✗ No use Evrysdi si el adaptador del frasco no está en el frasco. Comuníquese con Accredo de inmediato si recibe un frasco sin adaptador.
- ✗ No use Evrysdi si está en forma de polvo o si el frasco está dañado. Comuníquese con Accredo de inmediato si recibe un frasco que contiene Evrysdi en polvo.
- ✗ No deje que Evrysdi entre en contacto con la piel o los ojos. Si entra en contacto con la piel, lave la zona con agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua.
- ✗ No mezcle Evrysdi con alimentos, líquidos, fórmula o leche.
- ✗ No use Evrysdi si el frasco o las jeringas orales están dañados.
- ✗ No congele Evrysdi.
- ✗ No saque el medicamento del envase original para colocarlo en otro envase.
- ✗ No tome una dosis parcial, incluso si es todo lo que le queda en un frasco.



Guarde siempre Evrysdi en el refrigerador (36 °F a 46 °F)
Guarde siempre el medicamento en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños

Información importante de seguridad

- Antes de tomar Evrysdi, informe a su proveedor de atención médica sobre todos los problemas de salud que tenga; esto incluye:
 - Si está amamantando o planea amamantar. No se sabe si Evrysdi pasa a la leche materna y puede dañar a su bebé. Si planea amamantar, hable con su proveedor de atención médica acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé mientras recibe tratamiento con Evrysdi.

Vea la Información importante de seguridad adicional en todo el folleto y en las páginas 16 y 17.

- **Dígale a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que usa**, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Tenga preparada una lista de los medicamentos para mostrársela al proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando obtiene un medicamento nuevo.
- En la farmacia deben entregarle Evrysdi en forma de líquido que se puede administrar por la boca o a través de una sonda de alimentación. El farmacéutico es quien prepara la solución líquida. Si el medicamento que está en el frasco es un polvo, **no lo use**. Comuníquese con el farmacéutico para que le dé otro.
- Evite el contacto de Evrysdi con la piel o los ojos. Si Evrysdi entra en contacto con la piel, lave la zona con agua y jabón. Si Evrysdi entra en contacto con los ojos, enjuáguelos con agua.
- Los efectos secundarios más frecuentes de Evrysdi incluyen:
 - Para la SMA de inicio tardío:
 - fiebre
 - diarrea
 - erupción
 - Para la SMA infantil:
 - fiebre
 - diarrea
 - erupción
 - secreción nasal, estornudos, dolor de garganta y tos (infección de las vías respiratorias superiores)
 - infección pulmonar
 - estreñimiento
 - vómitos

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Evrysdi. Para obtener más información sobre el perfil de riesgos y beneficios de Evrysdi, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Puede reportar efectos secundarios **a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088** o en **www.fda.gov/medwatch**.

También puede reportar efectos secundarios a Genentech llamando al **1-888-835-2555**.

Consulte la Información de prescripción completa para obtener Información importante de seguridad adicional.



Evrysdi es el primer y único medicamento para tratar la SMA en el hogar

Antes de comenzar con Evrysdi, debe hacer lo siguiente:

- Comprender cuál es el proceso para preparar y tomar Evrysdi.
- Saber cómo guardar Evrysdi correctamente.
- Saber cómo medir la dosis usando las jeringas orales proporcionadas.
- Saber cómo tomar o administrar Evrysdi.
- Saber con quién debe comunicarse si tiene un problema con la entrega.
- Tener un plan para establecer una rutina diaria, de modo que usted o la persona a la que cuida pueda seguir el plan de tratamiento.



Para conectarse con un PAL local y recibir más información,
llame al (833) 387-9734 o visite www.Evrysdi.com/PAL

Consulte la Información de prescripción completa adjunta para obtener Información importante de seguridad adicional.

Genentech
Miembro del Grupo Roche



© 2020 Genentech USA, Inc. Todos los derechos reservados.
Impreso en EE. UU. M-US-00008280(v1.0) 01/2021

