

El único tratamiento oral para la atrofia muscular espinal (SMA)

Ahora en una tableta\*



**Líquido o en tabletas:  
¡Evrysdi viene con opciones!**

Los resultados comprobados y la seguridad de la forma líquida ahora vienen con la **flexibilidad de una tableta.**



### ¿Quiénes pueden tomar las tabletas de Evrysdi?

\*Las tabletas de Evrysdi han sido aprobadas para personas a partir de los 2 años que pesen al menos 44 lb (20 kg). Las tabletas no se pueden tomar con sondas de alimentación.

Consulte las preguntas más frecuentes al dorso.

### Conservación a temperatura ambiente<sup>†</sup>

Ya sea que esté trabajando o de vacaciones, puede viajar con las tabletas de Evrysdi sin necesidad de una hielera de viaje.

### A la medida de su estilo de vida

Puede tragar la tableta entera con agua o mezclada con agua potable sin cloro (p. ej., agua filtrada, agua embotellada), lo que le resulte más cómodo.

### No hace falta medir

Cada tableta de Evrysdi de una toma diaria ya contiene su dosis.

<sup>†</sup>De 68°F a 77°F (de 20°C a 25°C).

Consulte la sección sobre **Dosificación y administración de la Información de prescripción** y mire este **video que le mostrará cómo tomar las tabletas de Evrysdi.**

**Evrysdi es la única opción oral no invasiva para la SMA:**

✓ Sin agujas    ✓ Sin sedación    ✓ Sin hospitalizaciones

**Pregúntele a su médico si las tabletas de Evrysdi son adecuadas para usted.**

### ¿Qué es Evrysdi?

Evrysdi es un medicamento de venta con receta utilizado para tratar la atrofia muscular espinal (spinal muscular atrophy, SMA) en niños y adultos.

### Información de seguridad importante

- **Antes de tomar Evrysdi, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, incluso en los siguientes casos:**
  - Está embarazada o planifica quedar embarazada, ya que Evrysdi puede dañar al bebé en gestación. Solicite asesoramiento a su proveedor de atención médica antes de tomar este medicamento.
  - Es una mujer que puede quedar embarazada:
    - Antes de comenzar su tratamiento con Evrysdi, su proveedor de atención médica puede hacerle pruebas de embarazo.
    - Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para usted. Utilice un método anticonceptivo durante el tratamiento y hasta al menos 1 mes después de dejar de tomar Evrysdi.
    - **Registro de embarazos.** Hay un registro de embarazos para mujeres que toman Evrysdi durante el embarazo. El propósito de este registro es recopilar información sobre la salud de la mujer embarazada y la salud de su bebé. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si está embarazada o queda embarazada mientras recibe Evrysdi. Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo inscribirse en el Registro de embarazos de Evrysdi. Su proveedor de atención médica puede inscribirla en este registro o puede hacerlo usted misma llamando al **1-833-760-1098** o visitando **<https://www.evrysdipregnancyregistry.com>**.
  - Es un hombre adulto. Evrysdi puede afectar a la capacidad del hombre para tener hijos (fertilidad). Solicite asesoramiento a un proveedor de atención médica antes de tomar este medicamento.
  - Está en período de lactancia o tiene planes de amamantar. Se desconoce si Evrysdi pasa a la leche materna y podría dañar al bebé.
- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma.**
- Si le recetaron Evrysdi para solución oral, en la farmacia le entregarán Evrysdi en forma de líquido. Si el medicamento del frasco es en polvo, **no lo utilice.** Comuníquese con su farmacéutico para solicitar un reemplazo.

Consulte la **Información de prescripción completa** para obtener **Información de seguridad importante adicional.**

# Preguntas frecuentes sobre las tabletas de Evrydsi



## ¿Las tabletas solo pueden tragarse enteras?

Las tabletas de Evrydsi pueden tragarse enteras con agua o mezcladas con 1 cucharadita (5 ml) de agua embotellada a temperatura ambiente. No pueden masticarse, triturarse, cortarse ni disolverse en la lengua.

## ¿Por qué debo usar agua embotellada a temperatura ambiente para preparar la mezcla de las tabletas de Evrydsi?

Para que cada dosis sea homogénea, mézclelas siempre con agua embotellada. El cloro en el agua del grifo puede interactuar con el principio activo de Evrydsi.

## ¿Me pueden recetar Evrydsi en forma líquida y en tabletas para que pueda combinarlos según mis necesidades?

La posibilidad de cambiar de una formulación a otra dependerá de las conversaciones que mantenga con sus proveedores de atención médica y del seguro. No deje de preguntarle a su proveedor de atención médica cuál es la mejor opción para usted.

## ¿Qué tamaño tiene la tableta?

Las tabletas de Evrydsi tienen 6.6 mm (0.25 pulgadas) de diámetro y 4.1 mm (0.15 pulgadas) de alto, aproximadamente el tamaño de un grano de maíz.

## Todavía me queda un poco del medicamento que estoy tomando ahora. ¿Debo terminarlo para comenzar a tomar las tabletas de Evrydsi?

Su compañía de seguro puede exigirle que use todos los medicamentos que esté tomando antes de comenzar a tomar las tabletas de Evrydsi. Consulte con su compañía de seguro para confirmar.

## ¿Las tabletas de Evrydsi deben tomarse con alimentos?

Las tabletas de Evrydsi pueden tomarse con o sin alimentos. En cualquier caso, no influirá en la acción de la tableta. Solo recuerde tomarla más o menos a la misma hora todos los días.

## ¿Puedo tomar o administrar la mezcla de las tabletas por una sonda G o una sonda NG?

No, desafortunadamente no se puede administrar a través de una sonda de gastrostomía (sonda G) o una sonda nasogástrica (sonda NG). Si usted o la persona a quien cuida tiene una sonda G o NG, puede consultar a su proveedor de atención médica sobre la posibilidad de tomar Evrydsi en forma líquida.

## Si cambio de tratamiento para la SMA y empiezo a tomar las tabletas de Evrydsi, ¿tendré una interrupción en la cobertura?

Si tiene dudas sobre los costos o la cobertura del seguro, nuestros representantes de colaboración y acceso (Partnership and Access Liaisons, PAL) podrán ayudarle. Puede visitar [Evrydsi.com/PAL](http://Evrydsi.com/PAL) para obtener más información y conectarse con un PAL. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento.

## ¿Puedo obtener las tabletas de Evrydsi en una farmacia minorista?

Las tabletas de Evrydsi solo están disponibles en una farmacia especializada. Una vez recetadas, se enviarán directamente a su casa.

**Consulte a su médico  
sobre las tabletas  
de Evrydsi.**

## Información de seguridad importante (continuación)

- Evite el contacto de Evrydsi con la piel o los ojos. Si Evrydsi entra en contacto con la piel, lave la zona con agua y jabón. Si Evrydsi entra en contacto con los ojos, enjuáguese los ojos con agua.

- **Los efectos secundarios más frecuentes de Evrydsi son los siguientes:**

- Para la SMA de inicio tardío: fiebre, diarrea, erupción cutánea.
- Para la SMA de inicio en la infancia: fiebre; diarrea; erupción cutánea; goteo nasal, estornudos y dolor de garganta (infección de las vías respiratorias superiores); infección pulmonar (infección de las vías respiratorias inferiores); estreñimiento; vómitos; tos.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de Evrydsi. Para obtener más información sobre el perfil de riesgos y beneficios de Evrydsi, pregunte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Puede informar efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) llamando al **1-800-FDA-1088** o en [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch). También puede informar los efectos secundarios a Genentech al **1-888-835-2555**.

Consulte la [Información de prescripción completa](#) para obtener Información de seguridad importante adicional.